Anwendung

Novalac 1 Anfangsmilch ist für nicht gestillte Säuglinge ab der Geburt bis zum Alter von 6 Monaten geeignet. Ab dem Alter von 6 Monaten wird Folgemilchnahrung Novalac 2 empfohlen. Novalac 1 ist Teil einer breiten Palette von Produkten, die speziell auf die Ernährungsbedürfnisse von Säuglingen abgestimmt sind.

Wichtige Hinweise

Stillen ist die beste Ernährung für Ihr Baby. Wenn Sie eine Säuglingsnahrung verwenden möchten, dann ist das Produkt nur auf den Rat unabhängiger Fachleute auf dem Gebiet der Medizin, der Ernährung oder der Pharmazie bzw. anderer für Säuglings- und Kinderpflege zuständiger Personen zu verwenden. Besondere Aufmerksamkeit ist notwendig bei Kuhmilcheiweißallergie, bei Frühgeborenen, bei Neugeborenen mit niedrigem Geburtsgewicht oder geschwächtem Immunsystem. Unsachgemäße Zubereitung oder Lagerung der Säuglingsmilchnahrung kann ein Gesundheitsrisiko darstellen. Wenn Sie Ihr Baby mit der Flasche füttern, vergewissern Sie sich, dass die Zähne Ihres Babys nicht zu oft oder zu lange mit Milch in Berührung kommen, sonst steigt die Kariesgefahr für Ihr Baby. Nach der letzten Mahlzeit in der Nacht reinigen Sie immer die Zähne Ihres Babys.

Dosierung

Alter (Monate)	0–1	1–2	2–4	4–6
Anzahl der Mahlzeiten pro Tag	6	5	5	4
Anzahl der Messlöffel pro Mahlzeit	3	4	5	7
Wasseranteil (ml)	90	120	150	210

Ein gestrichener Messlöffel der beigefügt ist, enthält 4,3 g Novalac. Lösen Sie einen Messlöffel in 30 ml Wasser auf. Nach Absprache mit Ihrem Kinderarzt oder Apotheker sollen Menge und Anzahl aller Tagesmahlzeiten an die Bedürfnisse Ihres Babys abgestimmt werden. Wenn der Kinderarzt Ihnen nichts anderes empfiehlt, befolgen Sie die Empfehlungen in der Tabelle.

- Immer eine frische Mahlzeit zubereiten.
- Vor Wärme und Licht schützen, an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Nach Öffnen der Dose Inhalt innerhalb von 3 Wochen verbrauchen.
- Dose nach Gebrauch gut verschließen.
- Reste der Mahlzeit nicht aufbewahren, sondern entsorgen.
- Mindestens haltbar bis: siehe Boden.

Unter Schutzatmosphäre verpackt.

Hauptsitz: UP Medi-Europa SA, Schweiz
Vertreter: Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15,
A-2345 Brunn am Gebirge

MEDIS | www.novalac.at

20A1M19B 30158112

3 831061 011257

Novalac

1

Säuglingsmilchnahrung

0-6 Monate

800 g ℮

Novalac

Durchschnittliche Zusammensetzung

		100 g	100 ml
Energie	kJ	2126	276
	kcal	507	66
Fett	g	25	3,3
- davon gesättigte Fettsäuren	g	11,6	1,5
- Linolsäure	g	4,5	0,6
- Alpha-Linolensäure	mg	405	53
- DHA (Docosahexaensäure)	mg	120	16
- ARA (Arachidonsäure)	mg	30	4
Kohlenhydrate	g	59,7	7,8
- davon Zucker	g	43,3	5,6
Eiweiß	g	10,4	1,4
Vitamine			
A	µg	435	57
D	µg	11,2	1,5
E	mg	8,7	1,1
K	µg	60	7,8
C	mg	60	7,8
Thiamin	mg	0,8	0,10
Riboflavin	mg	1,3	0,2
Niacin	mg	4,5	0,6
B6	mg	0,5	0,07
Folsäure	µg	95	12
Folat	µg-DFE	170	22
B12	µg	1,7	0,2
Biotin	µg	18	2,3
Pantothensäure	mg	5	0,7
Mineralstoffe			
Natrium	mg	175	23
Kalium	mg	525	68
Chlorid	mg	390	51
Kalzium	mg	470	61
Phosphor	mg	265	34
Magnesium	mg	45	5,9
Eisen	mg	5	0,7
Zink	mg	3,3	0,4
Kupfer	mg	0,39	0,05
Mangan	mg	0,045	0,006
Fluorid	mg	<0,45	<0,06
Selen	µg	25	3,3
Jod	µg	98	13
Cholin	mg	170	22
Inositol	mg	80	10,4
Taurin	mg	40	5,2
L-Carnitin	mg	20	2,6

Zutaten

Magermilch, Milchproteine, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Palm, Soja, Kokosnuss), Tricalciumcitrat, **Fischöl** (DHA) (**Milch**), Calciumchlorid, Trikaliumcitrat, Emulgator (**Soja**-Lecithin), Dinatriumphosphat, Cholinbitartrat, Vitamine (C, E, Pantothensäure, Niacin, B1, A, B6, B2, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Trimagnesiumcitrat, L-Tyrosin, Öl aus Mortierella alpina (ARA) (**Milch**), L-Phenylalanin, Inositol, Taurin, L-Tryptophan, Eisensulfat, Dikaliumphosphat, L-Carnitin, Natriumchlorid, Zinksulfat, Natriumselenit, Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte), Kupfersulfat, Kaliumjodid, Mangansulfat.

Zubereitung

VOR DER ZUBEREITUNG GRÜNDLICH HÄNDE WASCHEN.

1. Flasche und Schnuller reinigen und 5 Minuten lang in kochendem Wasser sterilisieren.

2. Frisches Leitungswasser 5 Minuten lang abkochen.

3. Wasser auf 40 °C abkühlen und in die Flasche eingießen.

4. Die erforderliche Anzahl an Messlöffeln hinzufügen.

5. Babyflasche mit Kunststoffdeckel schließen und schütteln, bis das Pulver im Wasser vollständig aufgelöst ist.

6. Temperatur (37 °C) an der Innenseite des Handgelenks überprüfen.